

Rx **Levetiracetam Tablets IP 500 mg**

EPILEVET-500

Tablets

एपिलेवेट-500

Each Film coated tablet contains :
Levetiracetam IP 500 mg.
Excipients q.s.

Colour : Titanium Dioxide IP

Dosege : As directed by the Physician

Storage :

**Store Protected from light & moisture
at a temperature not exceeding 30°C**

Keep medicine out of reach of children

**CAUTION : Not to be sold by retail
without the prescription of a
Registered Medical Practitioner.**

Marketed By :

Mfg. Lic. No. : G/1324

BONGYN
Bioscience Pvt. Ltd.

Shed No 2-B, G.F. Block No 896, Near Shree Kanta Packaging
Opp Devam-4 Estate, Santej Super City Road Santej-382721
Taluka: Kalol District: Gandhinagar

Mfg. by : Shantam Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
546/2, At. Rakanpur, Ta. Kalol, Dist. Gandhinagar - 382 721
www.shantampharmaceuticals.com

उत्पाद जानकारी: EPILEVET-500

सामान्य जानकारी:

EPILEVET-500 में Levetiracetam Tablets IP 500 mg शामिल है, जो मिर्गी के रोगियों में दौरे को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवा है। Levetiracetam एक एंटीएपिलेप्टिक दवा है जो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को स्थिर करके दौरे की आवृत्ति और गंभीरता को कम करती है। यह Bongyn Bioscience Pvt Ltd का एक विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है, जिसे सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सटीकता से निर्मित किया गया है।

दवा वर्ग:

Levetiracetam एंटीएपिलेप्टिक दवाओं (AEDs) के वर्ग से संबंधित है, जो मस्तिष्क की गतिविधि को नियंत्रित करके दौरे को नियंत्रित करती हैं।

संकेत और उपयोग:

- वयस्कों और बच्चों में आंशिक-शुरूआती दौरों का इलाज।
- सामान्यीकृत टॉनिक-क्लोनिक दौरों का प्रबंधन।
- मिर्गी के लिए सहायक उपचार।

सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव:

सामान्य दुष्प्रभाव:

- नींद आना
- थकान

- चक्कर आना
- चिड़चिड़ापन

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- मूड में बदलाव या व्यवहार में परिवर्तन
- भूख में कमी
- त्वचा पर चकत्ते
यदि दुष्प्रभाव बने रहते हैं या बढ़ जाते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें।

खुराक और प्रशासन:

- अनुशंसित खुराक: अपने डॉक्टर द्वारा निर्देशित अनुसार, आमतौर पर दिन में दो बार एक टैबलेट।
- टैबलेट को पानी के साथ पूरा निगल लें, भोजन के साथ या बिना।
- टैबलेट को चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं।

चेतावनी और सावधानियां:

- इस दवा को अचानक लेना बंद न करें, क्योंकि यह दौरे के जोखिम को बढ़ा सकता है।
- यदि आपको गुर्दे की समस्या या अवसाद का इतिहास है, तो उपयोग से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें।
- मूड या व्यवहार में बदलाव पर निगरानी रखें और यदि वे होते हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

दवा पारस्परिक क्रिया:

- आप जो सभी दवाएं, सप्लीमेंट्स या हर्बल उत्पाद ले रहे हैं, उनकी जानकारी अपने डॉक्टर को दें, क्योंकि वे Levetiracetam के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं।
- शराब का सेवन न करें, क्योंकि यह नींद या चक्कर को बढ़ा सकता है।

निषेध:

- Levetiracetam या टैबलेट के किसी अन्य घटक के लिए ज्ञात अतिसंवेदनशीलता।
- डॉक्टर के मार्गदर्शन के बिना गंभीर गुर्दे की हानि वाले रोगियों के लिए अनुशंसित नहीं।

क्या करें और क्या न करें:

क्या करें:

- दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार ही लें।
- प्रभावशीलता को ट्रैक करने के लिए एक दौरा डायरी बनाए रखें।
- किसी भी अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।

क्या न करें:

- डॉक्टर से परामर्श किए बिना दवा को अचानक बंद न करें।
- निर्धारित खुराक से अधिक न लें।
- यदि आपको नींद महसूस हो रही हो, तो गाड़ी चलाने या मशीनरी चलाने से बचें।

EPILEVET-500 लेने से पहले:

- यदि आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करवा रही हैं, तो अपने डॉक्टर से चर्चा करें।
- दवाओं से एलर्जी के किसी भी इतिहास के बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- किसी भी मौजूदा चिकित्सा स्थिति, विशेष रूप से गुर्दे या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खुलासा करें।

संपर्क जानकारी:

Bongyn Bioscience Pvt Ltd

पता: 11, फर्स्ट फ्लोर, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद

फोन: +91 8160 351 340

ईमेल: info@bongyn.com

वेबसाइट: www.bongyn.com

अस्वीकरण:

यह जानकारी EPILEVET-500 को बेहतर ढंग से समझने के लिए है। हमेशा इस दवा को अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में लें। निर्धारित खुराक को बदले या बंद न करें।

सर्वाधिकार Bongyn Bioscience Pvt Ltd, 2025 के लिए सुरक्षित।