




ब्रांड नाम: LORNIBON-P

संरचना: लॉर्नोक्सिकैम 8 मिग्रा + पेरासिटामोल आईपी 325 मिग्रा टैबलेट्स

सामान्य जानकारी:

LORNIBON-P **Bongyn Bioscience Pvt Ltd** का एक प्रीमियम उत्पाद है, जिसे दर्द और सूजन से प्रभावी राहत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक टैबलेट में **लॉर्नोक्सिकैम 8 मिग्रा**, एक नॉन-स्टेरोइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID), और **पेरासिटामोल 325 मिग्रा**, एक एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक शामिल है। यह संयोजन दर्द, सूजन और बुखार को कम करने के लिए सहक्रियात्मक रूप से कार्य करता है। कड़े गुणवत्ता मानकों के तहत निर्मित, LORNIBON-P इष्टतम रोगी देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

दवा वर्ग:

- लॉर्नोक्सिकैम: नॉन-स्टेरोइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID)
- पेरासिटामोल: एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक

संकेत और उपयोग:

- तीव्र और पुरानी दर्द की स्थितियों जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस और रुमेटॉयड आर्थराइटिस का प्रबंधन
- मस्क्युलोस्केलेटल और जोड़ों के दर्द से राहत
- सूजन से जुड़े मध्यम से गंभीर दर्द का निवारण
- बुखार और संबंधित असुविधा को कम करना

सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव:

सामान्य दुष्प्रभाव:

- मतली
- उल्टी
- पेट दर्द
- दस्त
- चक्कर आना

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- त्वचा पर दाने
- कब्ज
- सिरदर्द
- लिवर एंजाइम में वृद्धि
- एलर्जी प्रतिक्रियाएं

यदि कोई दुष्प्रभाव बना रहता है या बिगड़ता है, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

खुराक और प्रशासन:

- **अनुशंसित खुराक:** डॉक्टर की सलाह अनुसार दिन में एक या दो बार एक टैबलेट लें।
 - टैबलेट को पूरा निगलें, अधिमानतः भोजन के बाद, पेट की परेशानी को कम करने के लिए।
 - निर्धारित खुराक से अधिक न लें।
-

चेतावनी और सावधानियां:

- गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर, रक्तस्राव, या छिद्रण के इतिहास वाले रोगियों में सावधानी से उपयोग करें।
 - लिवर या किडनी की समस्या वाले रोगियों के लिए नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है।
 - गर्भावस्था के अंतिम तिमाही के दौरान LORNIBON-P के उपयोग से बचें।
 - हृदय संबंधी स्थितियों वाले रोगियों को उपयोग से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए।
 - दीर्घकालिक उपयोग के लिए लिवर फंक्शन की निगरानी की आवश्यकता हो सकती है।
-

दवा अंतःक्रियाएं:

- गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दुष्प्रभावों के जोखिम को कम करने के लिए अन्य NSAIDs या कॉर्टिकोस्टेरोइड्स के साथ सहवर्ती उपयोग से बचें।
 - एंटीकॉगुलेंट्स के साथ मिलकर उपयोग से रक्तस्राव का जोखिम बढ़ सकता है।
 - ऊयूरेटिक्स और ACE इनहिबिटर्स LORNIBON-P की प्रभावकारिता को कम कर सकते हैं।
 - आप जो भी दवाएं और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उनके बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।
-

मतभेद:

- लॉनोक्सिकैम, पेरासिटामोल, या टैबलेट में किसी भी सहायक पदार्थ के प्रति अतिसंवेदनशीलता।
 - गंभीर लिवर या किडनी की समस्या वाले रोगी।
 - सक्रिय या गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव का इतिहास।
 - गंभीर हृदय विफलता।
-

क्या करें और क्या न करें:

क्या करें:

- LORNIBON-P को बिल्कुल डॉक्टर के निर्देशानुसार लें।
- किसी भी पूर्व-मौजूदा स्थिति या चल रहे उपचार के बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- उपचार के दौरान हाइड्रेटेड रहें और संतुलित आहार बनाए रखें।

क्या न करें:

- डॉक्टर से परामर्श किए बिना स्वयं दवा न लें या खुराक को समायोजित न करें।
 - उपचार के दौरान शराब का सेवन न करें।
 - यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो इस दवा का उपयोग बिना चिकित्सा सलाह के न करें।
-

LORNIBON-P लेने से पहले:

- किसी भी एलर्जी या अतिसंवेदनशीलता के बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।
 - अपनी चिकित्सा इतिहास पर चर्चा करें, विशेष रूप से यदि आपको लिवर, किडनी, या हृदय की समस्या है।
 - यदि आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करवा रही हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
-

संपर्क जानकारी:

Bongyn Bioscience Pvt Ltd

पता: 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद

फोन: +91 8160 351 340

ईमेल: info@bongyn.com

वेबसाइट: www.bongyn.com

अस्वीकरण:

यह LORNIBON-P के बारे में सामान्य जानकारी है। इस दवा का उपयोग हमेशा अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में करें। बिना चिकित्सा परामर्श के निर्धारित खुराक को न बदलें या बंद न करें।

सर्वाधिकार सुरक्षित Bongyn Bioscience Pvt Ltd. 2025